

INTERVENIAMO SULLE CAUSE

ALTRIMENTI I PROGRAMMI DI DISINFESTAZIONE
POSSONO RISULTARE INEFFICACI



A CURA DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE
PROTOCOLLO D'INTESA INTERISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

www.provincia.oristano.it

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO
AZIENDA U.S.L. n. 5 • ORISTANO
PROVEDITORATO AGLI STUDI DI ORISTANO

admpe


se la
zecca
ti becca...




Esistono diversi tipi di **zecche** che parassitano alcune specie animali. La zecca, nel dialetto sardo **cadranca**, succhia dagli animali parassitati il sangue necessario per il ciclo riproduttivo e poi depone le uova. Gli animali parassitati quali i **cani**, soprattutto quelli **randagi**, e le **pecore**, con i loro spostamenti trasportano ovunque le zecche (centri abitati, spiagge, cortili...). **Occasionalmente anche l'uomo può essere punto dalla zecca.**

i provvedimenti necessari

come comportarsi per ridurre l'infestazione




Vietare il transito di bestiame nelle aree urbane e periurbane, nelle spiagge e pinete. Adottare iniziative per combattere il randagismo animale.



Provvedere alla costante pulizia delle aree pubbliche da erbacce, sterpaglie e rifiuti in genere (compito a carico delle Amministrazioni Comunali).

la collaborazione di tutti

Ispezionare giornalmente il proprio cane, soprattutto nel periodo primavera-estate e, in caso di presenza di zecche, provvedere alla loro rimozione disinfestando l'animale, la sua cuccia e l'ambiente circostante.



Limitare le possibilità di reinfestazioni evitando di lasciare il cane libero in campagna in vicinanza di greggi. Mantenere sempre puliti i cortili e i terreni privati, osservando le apposite ordinanze Comunali, nel rispetto della cittadinanza.

in caso di puntura

Rivolgersi sempre al medico, ma evitare eccessivi allarmismi.

Se una zecca infetta punge l'uomo non sempre si sviluppa una malattia. La rickettsiosi, la malattia febbrile trasmessa da alcuni tipi di zecca, è facilmente curabile con comuni antibiotici. Solo in rari casi la malattia può avere andamento grave, quando ad esserne colpiti sono persone anziane, soggetti debilitati o in mancanza di una terapia specifica.



È comunque necessario adottare i seguenti comportamenti:

- la zecca può essere rimossa applicando alcune gocce di olio, che impedisce la respirazione del parassita o mediante l'alcool aspettando alcuni minuti affinché faccia il suo effetto.
- con una pinzetta sottile deve essere completata l'asportazione, avendo cura di non schiacciare la zecca per non aumentare il rischio di trasmettere l'infezione.